

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: CIRUELO

Boyuela

Tamaño: Medio.

Forma: Semi-esférica. Vista de frente redondeada, de perfil elíptica. Depresión bastante acusada en la zona ventral, disminuyendo hacia el punto pistilar.

Zona pistilar: Redondeada, deprimida. **Punto pistilar:** Tamaño variable, en general mediano o pequeño. Redondeado, amarillento. Superficial, situado en un pocillo bastante marcado.

Sutura: Bien visible por estar recubierta de pruina. Línea muy fina, incolora, como marcada con un alfiler y, en algunos, puntos hundidos. Hendida y situada entre dos protuberancias junto a cavidad peduncular, en depresión mediana en el resto.

Cavidad del pedúnculo: Estrecha, bastante profunda. Bruscamente rebajada en la sutura y sin rebajar o un poco más levantada en el lado opuesto. **Pedúnculo:** Corto, grueso o mediano. Muy pubescente.

Piel: Recubierta de pruina abundante, azulado blanquecina. No se aprecia pubescencia. **Color:** Rojo granate o amoratado. Punteado abundante, muy menudo, blanquecino con aureola más oscura que el color general del fruto, poco visible.

Carne: Amarillo ámbar. Transparente.

Hueso: Adherente. Pequeño. Elíptico, aplastado. Zona ventral muy surcada y esculpida, con frecuencia con quilla, más o menos saliente. Surco dorsal discontinuo. Caras laterales semi granulosas, más lisas y con surcos junto a la truncadura, ésta es muy amplia.

Maduración: Segunda quincena de junio? (Lepe, Huelva)

